¡Cuidado! Temporada de araña violinista

Generado por IA — Nueva Escuela Mexicana Digital

Flashcards

PREGUNTA

¿Cuándo ocurre la temporada de la araña violinista en México?

RESPUESTA

Entre abril y septiembre.

PREGUNTA

¿Qué tamaño tiene la araña violinista?

RESPUESTA

Mide entre 7 y 15 mm.

PREGUNTA

¿Qué características tiene la araña violinista?

RESPUESTA

Es nocturna, venenosa y su mordedura puede causar necrosis en la piel. En casos graves, puede provocar complicaciones fatales.

PREGUNTA

¿Dónde suele esconderse la araña violinista?

RESPUESTA

En zapatos, camas, muebles, armarios, jardines, piedras, macetas y bancas. Prefiere lugares oscuros, cálidos y con poco movimiento.

PREGUNTA

¿Qué tan peligroso es el veneno de la araña violinista?

RESPUESTA

Su veneno puede ser hasta 10 veces más dañino que el ácido sulfúrico.

PREGUNTA

¿Qué medidas de prevención se pueden tomar contra la araña violinista?

RESPUESTA

Sellar grietas en paredes y techos, evitar tocarla directamente y sacudir ropa y zapatos antes de usarlos.

PREGUNTA

¿Por qué es importante la limpieza para prevenir la araña violinista?

RESPUESTA

Porque la limpieza y la prevención ayudan a evitar su presencia y posibles mordeduras.

PREGUNTA

¿Qué hacer si encuentras una araña violinista?

RESPUESTA

Evita tocarla directamente y toma medidas para eliminarla de forma segura.

Resumen: Prevención y cuidados durante la temporada de la araña violinista en México

Nivel: secundaria

- La temporada de la araña violinista ocurre entre abril y septiembre en México, y su mordedura puede causar necrosis en la piel o complicaciones graves.
- Es una araña nocturna y venenosa que se esconde en lugares oscuros, cálidos y con poco movimiento, como zapatos, camas, muebles y jardines.
- El veneno de esta araña puede ser hasta 10 veces más dañino que el ácido sulfúrico, lo que la hace especialmente peligrosa.
- Se recomienda sellar grietas, sacudir ropa y zapatos antes de usarlos, y evitar tocarla directamente para prevenir accidentes.
- La limpieza y la prevención son fundamentales para reducir el riesgo de encuentros con esta araña.

Mapa Conceptual

Temporada de araña violinista en México

Descripción general

Ocurre entre abril y septiembre | Araña nocturna y venenosa | Tamaño de 7 a 15 mm | Puede causar necrosis en la piel | Complicaciones fatales en casos graves

Hábitat y escondites

Zapatos, camas, muebles y armarios | Jardines, piedras, macetas y bancas | Prefiere lugares oscuros, cálidos y con poco movimiento

Peligrosidad

Veneno hasta 10 veces más dañino que el ácido sulfúrico | Puede provocar lesiones graves en la piel

Prevención

Sellar grietas en paredes y techos | Evitar tocarla directamente | Sacudir ropa y zapatos antes de usarlos | Mantener limpieza en el hogar