# Evolución de la anorexia

Generado por IA — Nueva Escuela Mexicana Digital

## Flashcards

PREGUNTA

¿Qué porcentaje de pacientes con anorexia puede pasar a una recuperación con una intervención adecuada?

RESPUESTA

El 50% de los pacientes puede pasar a una recuperación con una intervención adecuada.

PREGUNTA

¿Qué tipo de intervenciones son necesarias para una recuperación adecuada en pacientes con anorexia?

RESPUESTA

Se requieren intervenciones médicas, psicoterapéuticas y psiquiátricas.

PREGUNTA

¿Qué porcentaje de pacientes con anorexia resulta intratable?

RESPUESTA

Entre el 10% y el 20% de los pacientes con anorexia resulta intratable.

PREGUNTA

¿Cuáles son las principales causas de fallecimiento en pacientes con anorexia intratable?

RESPUESTA

El 50% de los fallecimientos es por suicidio y el otro 50% por complicaciones médicas severas.

PREGUNTA

¿Qué caracteriza a los casos de anorexia considerados intratables?

RESPUESTA

Se presentan complicaciones médicas severas que dificultan la recuperación.

PREGUNTA

¿Qué porcentaje de pacientes con anorexia intratable fallece por complicaciones médicas?

RESPUESTA

El 50% de los pacientes con anorexia intratable fallece por complicaciones médicas.

PREGUNTA

¿Qué porcentaje de pacientes con anorexia intratable fallece por suicidio?

RESPUESTA

El 50% de los pacientes con anorexia intratable fallece por suicidio.

## Resumen: Entendiendo la Evolución de la Anorexia y sus Riesgos

Nivel: bachillerato

- La recuperación de la anorexia depende de recibir una intervención adecuada que incluye atención médica, psicoterapéutica y psiquiátrica.
- Entre un 10% y un 20% de los casos de anorexia se consideran intratables debido a complicaciones graves.
- En los casos más graves, el fallecimiento ocurre en un 50% por suicidio y en el otro 50% por complicaciones médicas relacionadas con la enfermedad.

## Mapa Conceptual

### Evolución de la anorexia

**Recuperación**

50% de los pacientes pueden recuperarse | Requiere intervención adecuada | Intervenciones: médica, psicoterapéutica y psiquiátrica

**Porcentaje intratable**

10-20% de los pacientes | Complicaciones médicas severas | Asociado a alta mortalidad

**Causas de fallecimiento**

50% por suicidio | 50% por complicaciones médicas