

¿Cómo lograr identificar si existe bulimia en infancias de edad preescolar?

Generado por IA — Nueva Escuela Mexicana Digital

Flashcards

PREGUNTA

¿Es común que los trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia se presenten en niños de edad preescolar?

RESPUESTA

No, los trastornos de la conducta alimentaria suelen tener su origen durante la adolescencia. En casos raros, pueden aparecer alrededor de los 9 o 10 años.

PREGUNTA

¿Qué desarrollo cognitivo es necesario para que se presenten trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia?

RESPUESTA

Es necesario que el pensamiento y la autopercepción de la imagen estén desarrollados, lo cual no ocurre en la etapa preescolar.

PREGUNTA

¿Qué tipo de trastornos alimentarios pueden observarse en niños de edad preescolar?

RESPUESTA

En niños preescolares pueden observarse trastornos de la ingesta de alimentos, como la pica, la selectividad alimentaria, la rumiación o la regurgitación.

PREGUNTA

¿Qué es la pica en niños preescolares?

RESPUESTA

Es un trastorno de la ingesta de alimentos en el que los niños comen sustancias no comestibles, como tierra o yeso, como parte de conductas exploratorias.

PREGUNTA

¿Qué es la selectividad alimentaria en niños preescolares?

RESPUESTA

Es un trastorno de la ingesta en el que los niños solo consumen ciertos tipos de alimentos durante periodos de tiempo.

PREGUNTA

¿Qué es la rumiación o regurgitación en niños preescolares?

RESPUESTA

Es el regreso de los alimentos desde el estómago hacia la boca, que puede ocurrir como parte de conductas exploratorias y de integración neurosensorial.

PREGUNTA

¿Por qué no se puede diagnosticar anorexia o bulimia en niños preescolares?

RESPUESTA

Porque los niños en esta etapa no tienen una autopercepción formada ni distorsiones en la imagen corporal, elementos clave en estos trastornos.

PREGUNTA

¿Cuál es la diferencia entre trastornos de la ingesta de alimentos y trastornos de la conducta alimentaria?

RESPUESTA

Los trastornos de la ingesta de alimentos incluyen conductas como la pica y la selectividad alimentaria, mientras que los trastornos de la conducta alimentaria, como la bulimia, implican distorsiones en la imagen corporal y suelen aparecer en la adolescencia.

Resumen: Identificación de trastornos alimentarios en niños en edad preescolar

Nivel: bachillerato

- Los trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia suelen desarrollarse en la adolescencia, ya que requieren una autopercepción y distorsión de la imagen corporal que no está formada en la etapa preescolar.
- En niños preescolares (3 a 5 años), pueden presentarse trastornos de la ingesta alimentaria, como la pica (ingestión de sustancias no alimenticias) y la selectividad alimentaria (preferencia por ciertos alimentos).
- Es importante no confundir conductas como la rumiación o regurgitación en niños pequeños con trastornos de la conducta alimentaria, ya que estas suelen ser parte de su desarrollo exploratorio y sensorial.
- La anorexia o bulimia no son comunes en niños preescolares debido a la falta de desarrollo del pensamiento complejo y la autopercepción necesarios para estos trastornos.
- La identificación temprana de problemas alimentarios en esta etapa debe centrarse en patrones de ingesta y comportamientos exploratorios, no en distorsiones de la imagen corporal.

Mapa Conceptual

Identificación de bulimia en infancias preescolares

Desarrollo del pensamiento y autopercepción

Pensamiento y autopercepción no desarrollados antes de los 6 años

Distorsiones de la imagen corporal no presentes en etapa preescolar

Trastornos de alimentación en etapa preescolar

Trastornos en la ingesta de alimentos

Trastornos de la conducta alimentaria

Trastornos en la ingesta de alimentos

Pica: consumo de tierra o yeso

Selectividad alimentaria: consumo limitado a ciertos alimentos

Rumiación o regurgitación: regreso de alimentos como conducta exploratoria

Diferencias con trastornos de conducta alimentaria

No confundir con anorexia por restricción

No confundir con bulimia por inducción del vómito